

1 Při pohledu shora otočte návlek do poloviny naruby. K nasazení návleku použijte naše speciální rukavice Ofa Grip. Nyní návlek natáhněte na paži.

2 Rozprostřete zbytek pažního návleku rovnoměrně až k podpaží. Nevytahujte návlek velkou silou za horní nebo dolní okraj, jinak můžete materiál přetížit.

3 Nyní si návlek nasaďte rovnoměrně na ruku tak, aby na něm nebyly žádné záhyby.

4 Je zcela zásadní punčochu nasadit bez skladů, aby nedocházelo k jejímu zauzlení.

ofa bamberg

Špičková kvalita

od firmy Ofa Bamberg

Spolu s provedením na míru nosíte výsledek dlouholetého výzkumu a vývoje. Pečlivé zpracování a vysoká kvalita jsou zajištěny a kontrolovány pomocí nejnovějších technologií. Pravidelná certifikace nezávislými kontrolními institucemi dokumentuje odpovědné zacházení s našimi produkty.

Například výrobky na míru Ofa dodržují nejpřísnější předpisy o kvalitě a testování na světě pro zdravotnické kompresní punčochy (RAL-GZ 387/1) a splňují normu Oeko-Tex Standard 100, která stanovuje použití nezávadných materiálů a barviv.

**Děláme maximum pro to,
abyste mohli stát pevně na nohou!**

Indikace (viz také doporučení pro zdravotní kompresivní terapii AWMF 037/005, pol. 12/18)
- Zlepšení žilních příznaků a kvality života u chronických žilních onemocnění
- Prevence a terapie žilních edémů
- Prevence a terapie žilních kožních onemocnění
- Ekzém a pigmentace
- Dermatoliposkleróza a atrophie blanche
- Terapie a tlumení bolesti u žilních bércových vředů a prevence recidiv
- Terapie arteriálních a venózních bércových vředů (viz kontraindikace)
- Křečové žíly
- Úvodní fáze terapie křečových žil
- Funkční žilní nedostatečnost
- Žilní malformace
- Žilní trombóza
- Stav po trombóze
- Posttrombotický syndrom
- Profylaxie trombózy u mobilních pacientů
- Lymfedém
- Edém v těhotenství
- Posttraumatický/pooperační edém
- Cyklický idiopatický edém
- Lipedém od stádia II
- Městnání v důsledku imobility (artrogenní městnání, parézy a částečné parézy končetiny)
- Edémy spojené s povoláním (stání, sezení)
- Farmakogenní edémy, když není možná změna terapie
- Obezita s funkční žilní nedostatečností
- Zánětlivé dermatózy dolních končetin
- Nevolnost, závratě a potíže s městnáním v těhotenství
- Stav po popáleninách
- Terapie jizev

Kontraindikace
Absolutní kontraindikace:
- Pokročilé periferní cévní onemocnění
- Dekompenzovaná srdeční nedostatečnost
- Septická flebitida
- Phlegmasia coerulea dolens

Relativní kontraindikace:
- Mokvavé dermatózy
- Intolerance materiálů kompresivních punčoch
- Těžké poruchy citlivosti končetiny
- Pokročilá periferní neuropatie (např. diabetes mellitus)
- Chronická polyartritida

Pokud nebudou dodrženy tyto kontraindikace, výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost.

⚠ Rizika a vedlejší účinky
U citlivé pokožky se může pod kompresivními punčochami objevit svědění a kožní problémy. V takovém případě je doporučována adekvátní kožní terapie.

U následujících příznaků je nutné punčochy ihned sejmout a domluvit se s lékařem na pokračování terapie: modré nebo bíle zbarvení nehtů, brnění a necitlivost, zhoršující se bolesti, dýchavičnost a pocení, akutní omezení pohybu.

Záruka
Zdravotní kompresní punčochy lze ve správných podmínkách skladovat maximálně 3 roky. K tomu se připočítává doba nošení, která při pravidelném používání a péči dle doporučení činí maximálně 6 měsíců. Po uplynutí této doby již nepodléhá záruce a je nutné jej vyřadit.
Vady spojené s běžným opotřebením nebo nesprávným použitím jsou vyloučeny ze záruky. Nesprávné použití zahrnuje také následné změny produktu, které nebyly provedeny výrobcem.
Produkt je určen pro jednoho pacienta. Pokud bude předán dalším osobám k opětovnému použití, odpovědnost výrobce za produkt zaniká.

Likvidace
Po uplynutí použitelnosti zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.

Ohlašovací povinnost
Ze zákona musí pacienti a uživatelé ihned hlásit závažné nežádoucí účinky spojené s použitím produktu, které vedly nebo mohly vést k významnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, výrobci a příslušným národním úřadům (v Německu BfArM).

pro specializovaného prodejce: Údaje o punčochách pro archivaci

ofa bamberg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg
Tel. + 49 951 6047-777
Fax + 49 951 6047-186
export@ofa.de
www.ofa.de

Rev. 01.04.2021

Pas k punčochám

Pas k punčochám

Mějme pro vás provedení na míru!

ofa bamberg

Aby vaše přání objednávka probíhala jednoduše a bez komplikací, najdete vlevo **svůj personalizovaný pas k punčocháms** se všemi informacemi o rozměrech. Jednoduše jej odejměte, nalepte a náležitě uchovejte.

S nejlepšími doporučeními
Vaše Ofa Bamberg

Poznámka pro vaši praktiku:

Kompresní punčochy
správné pranί

Lastofa Forte perte lícem nahoru, přip. Lastofa Extra perte naruby a nepoužívejte avivážί!

- 40 Program na jemné látky
- Nepoužívejte bělidlo
- Sušte šetrně
- Nežehlete
- Nečistěte chemicky

Pranί
- vložené k okamžitému nošení
- doporučení: předpranί použitím výpere
- běžné pranί (max.40°C), v ruce nebo v pračce v režimu jemného pranί
- samostatné s praclm prostředky na jemné pranί (např. „speciální pracί prostředek Ofa Clean"), nepoužívejte avivážť
- pečlivě opláchněte, šetrně vyždímejte, ale punčocha při tom nekrutte
- rozložte punčocha na rucník a sušte ji na vzduchu nebo v sušičce v režimu šetrného sušenί, nikdy ji nežehlete a nesušte na topenί nebo na slunci

Materiálové složenί
Vyrobeno z polyamidu (Polyamid), elastanu (Elastan) a bavlny (Baumwolle) nebo vlny merino (Merinowolle). Konkrétní informace naleznete na textilním štítku vsítém do punčochy.

Péče
- skladujte v suchu, nejlépe v originálním obalu, chraňte před přímým slunečním zářenίm a teplem
- nedopouštějte, aby punčochy se silikonovým povrchem přišly do styku s rozpouštědly, mastmi, krémy a zvlhčujícími přípravky vodamι, protože tak může dojít k trvalému zhoršenί přilnavostι
- je bezpodmínečně nutné, abyste pravidelně pečovalι o své nohy a nosilι nezávadnou obuv
- tvorba uzlíků ve tkanině je u textilu zcela běžná a nepředstavuje důvod k reklamacι
- poškozenί punčochy nikdy neopravujte sami, ale přineste ji zpět ke specializovanému prodejcι, u kterého byla punčocha zakoupena

Účel
Kompresivnί punčochy se používají k terapii flebologických a lymfologických onemocnění hornícha dolních končetin a také u lipedému. Volba různých produktů závisí na individuálι.

Přínos funkce zdravotních kompresivních punčoch
Produkty určené k daně indikaci a kontrolovaný tlak brání zpětnému toku krve, čímž zlepšují tkáňovou mikrocirkulaci a odtok lymfy.

⚠ Důležité pokyny
– kompresivní punčochy noste pouze po konzultaci se svým lékařem
– předpokladem pro úspěšnou léčbu je každodenní nošenί a pravidelná kontrolv
– prodej a poradenstvί může poskytovat pouze lékařsky vyškolený personál
– v případě akutní bolestι nohou nebo kožních reakcí okamžitě vyhledejte lékaře
– okraj punčochy můžete pravidelně mírně posouvat, čímž předejdete podrážděnί pokožky
– máte-li problémy s kvalitou nebo chcete-li punčochu reklamovat, obraťte se na svého specializovaného prodejce